

DIPTRON® 25 PPM

BRODIFACOU FRESH BAIT

Opis:

Świeża przynęta o pełnej skuteczności przeciwko szczurom i myszom. Gotowa do użycia przynęta w postaci pasty, przeznaczona do stosowania w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych, w porowatych saszetkach.

Mus musculus (mysz domowa)

Rattus norvegicus (szczur wędrowny / szczur brunatny)



Szkodniki:

Środki ochrony osobistej:

Półmaska filtrująca chroniąca przed cząstkami
Rękawice ochronne odporne na działanie substancji chemicznych
Okulary ochronne chroniące przed uderzeniami cząstek
Odzież ochronna
Obuwie robocze

Właściwości:

Silnie działający antykoagulant najnowszej generacji. Szczególnie polecany do zwalczania gryzoni odpornych na inne rodenticydy. Formuła zawiera wysokiej jakości składniki, zapewniające wysoką atrakcyjność przynęty. Skuteczny po jednorazowym pobraniu, przy niższej dawce niż w przypadku wielu innych rodenticydów.

Właściwości fizykochemiczne:

Stan fizyczny: Ciało stałe
Barwa: Niebieska
Zapach: Bezwonny
Gęstość względna: 1,15–1,25

Przechowywanie:

Warunki przechowywania i okres trwałości: Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Opakowanie przechowywać szczelnie zamknięte i chronić przed światłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci, ptaków, zwierząt domowych oraz zwierząt gospodarskich. Produkt zachowuje stabilność przez 2 lata.

Sposób użycia:

Wewnątrz pomieszczeń:

Szczury i myszy: Na początku zwalczania stacje deratyzacyjne należy kontrolować co najmniej co 2–3 dni w przypadku myszy oraz co 5–7 dni w przypadku szczurów, a następnie co najmniej raz w tygodniu. Podczas kontroli należy sprawdzać pobieranie przynęty oraz stan stacji deratyzacyjnych, a także usuwać martwe gryzonie. W razie potrzeby uzupełniać przynętę w stacjach deratyzacyjnych.

Wokół budynków:

Szczury: Przynętę należy chronić przed działaniem warunków atmosferycznych (deszczem, śniegiem itp.). Stacje deratyzacyjne należy umieszczać w miejscach niezagrażonych zalaniem.

Po rozpoczęciu zwalczania stacje deratyzacyjne należy kontrolować co najmniej co 5–7 dni, a następnie co najmniej raz w tygodniu. Podczas kontroli należy sprawdzać pobieranie przynęty oraz stan stacji deratyzacyjnych, a także usuwać martwe gryzonie.

W razie potrzeby uzupełniać przynętę w stacjach deratyzacyjnych. Przynęty uszkodzone przez wodę lub zanieczyszczone należy wymienić.



Skład:

Brodifakum 0,0025%



Dawkowanie:

Myszy (wewnątrz pomieszczeń):

20–40 g przynęty na jedną stację deratyzacyjną.

Szczury (wewnątrz pomieszczeń i wokół budynków):

100–200 g przynęty na jedną stację deratyzacyjną.

Jeżeli konieczne jest zastosowanie więcej niż jednej stacji deratyzacyjnej, minimalna odległość między stacjami powinna wynosić 5 metrów.



Opakowanie:

Karton 10 kg

Wiadro 3 kg