

DIPTRON® CULIXCARE

Opis:

Środek odstraszaający komary i inne owady. Środek odstraszaający owady, przeznaczony do ochrony zwierząt gospodarskich przed owadami krwio pijnymi. Zawiera składniki pochodzenia roślinnego.

Szkodniki:

Owady latające:

Komary (Culicoides, Aedes i Culex), muchy, gzy...

Pasożyty pelzające:

Pchły, kleszcze, roztocza...

Środki ochrony osobistej:

Obuwie robocze

Właściwości:

Preparat jest skuteczny przeciwko komarom z rodzajów Culicoides, Aedes i Culex, które mogą przenosić choroby wektorowe, takie jak guzowata choroba skóry bydła (LSD), choroba niebieskiego języka (BT) oraz epizootyczna choroba krwotoczna (EHD). Wykazuje również skuteczność wobec much, gzów, pcheł, kleszczy oraz ptaszyńca kurzego (Dermanyssus gallinae).

Stosowanie preparatu pomaga ograniczyć obecność owadów i pasożytów na zwierzętach, zmniejszając tym samym ryzyko przenoszenia chorób wektorowych, a także występowania stresu i podrażnień skóry.

Właściwości fizykochemiczne:

Stan fizyczny: Ciecz

Barwa: Brązowa

Zapach: Charakterystyczny

Gęstość względna: 0,97

Sposób użycia:

Koncentrat do rozcieńczania w wodzie.

Do bezpośredniego stosowania na zwierzęta oraz do aplikacji metodą zanurzeniową.

Przechowywanie:

Produkt nie wymaga stosowania szczególnych środków ostrożności podczas przechowywania.

W ramach ogólnych zasad przechowywania należy unikać źródeł ciepła, promieniowania i energii elektrycznej oraz kontaktu z żywnością.

Przechowywać z dala od środków utleniających oraz materiałów o silnie kwaśnym lub zasadowym charakterze.

Przechowywać opakowania w temperaturze od 5 do 35°C, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

Przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi. Przestrzegać instrukcji podanych na etykiecie. Po otwarciu opakowanie należy dokładnie zamknąć i przechowywać w pozycji pionowej, aby zapobiec wyciekom.



Skład:

Ekstrakt z neem – 4%

Uwodorniony, cyklizowany olejek z eukaliptusa cytrynowego – 4%



Dawkowanie:

• **Duże nasilenie owadów / sezonowe zwiększenie ich aktywności:**

stosować w dawce zabiegowej 1,6% (16 ml/l) i powtarzać aplikację co 7–10 dni.

• **Umiarkowane lub niskie nasilenie owadów:** stosować w dawce podtrzymującej 0,8% (8 ml/l) i powtarzać aplikację co 10 dni.

• **W warunkach dużego nasilenia komarów, opadów deszczu, kąpieli, intensywnego pocenia się zwierząt lub w przypadku zwierząt szczególnie narażonych na kontakt z owadami na zewnątrz:**

skrócić odstęp między aplikacjami do 5–7 dni.

• **Po umyciu lub intensywnym zanurzeniu zwierzęcia w wodzie:**

rozważyć ponowną aplikację, jeżeli działanie odstraszaające uległo wyraźnemu osłabieniu.



Opakowanie:

1 L